NQ - Low and Rieke - 1974



N

$\lambda_c = 11.05$	$\lambda_\circ = 11.10$	$\lambda_{peak} = 10.53$	$\lambda_{gauss} = 11.10$	*3000*	*1500*	*800*	*400*	*200*	*100*
WHM = 3.06	W10% = 3.35	W80% = 2.54	FWHM = 2.47	10.85	10.87	10.91	11.00	11.20	11.57
$W_\circ = 2.63$				[2.54]	[2.55]	[2.58]	[2.60]	[2.55]	[2.13]
$\mu = 0.86$									
$I_{asym} = -0.02$	$\lambda_{eff}(T) = 10.83 + 0.56\ \Psi + 0.53\ \Psi^2 - 0.36\ \Psi^3$			$W_{eff}(T) = 2.52 + 0.64\ \Psi - 1.28\ \Psi^2 + 0.26\ \Psi^3$					
$I_{kurt} = -1.03$									

Q

$\lambda_c = 20.56$	$\lambda_\circ = 20.78$	$\lambda_{peak} = 18.60$	$\lambda_{gauss} = 20.30$	*3000*	*1500*	*800*	*400*	*200*	*100*
WHM = 5.12	W10% = 7.94	W80% = 3.13	FWHM = 3.67	20.12	20.14	20.18	20.28	20.53	21.12
$W_\circ = 3.91$				[3.73]	[3.75]	[3.77]	[3.81]	[3.85]	[3.71]
$\mu = 1.94$									
$I_{asym} = 0.35$	$\lambda_{eff}(T) = 20.10 + 0.55\ \Psi + 0.76\ \Psi^2 - 0.29\ \Psi^3$			$W_{eff}(T) = 3.72 + 0.38\ \Psi - 0.10\ \Psi^2 - 0.29\ \Psi^3$					
$I_{kurt} = -0.75$									